



Settimana
della
Biodiversità
Pugliese

Agricoltura
Alimentazione
e Ambiente


17-21
MAGGIO
2021

BIODIVERSAMENTE: BULBOSE SPONTANEE IN PUGLIA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Prof.ssa Barbara De Lucia
Dipartimento di Scienze
Agro-Ambientali e Territoriali
(DISAAT)



PREMESSA

Appartengono al gruppo delle «bulbose» le piante che sopravvivono alla stagione avversa grazie ai semi ma soprattutto ad organi specializzati di riserva, ipogei, la cui principale funzione è quella di conservare riserve alimentari ed idriche per la successiva stagione vegetativa e quindi assicurare la sopravvivenza della specie.

SPECIE BULBOSE SPONTANEE IN PUGLIA

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

Chamaeiris foetidissima (L.) Medik

Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.

Moraea sisyrinchium (L.) Ker-Gawl.

Ornithogalum umbellatum L.

Asphodeline lutea (L.) Rchb.

Muscari comosum (L.) Mill.

Pancratium maritimum L.

Gladiolus italicus Mill.

Charybdis maritima (L.) Speta



ROMULEA BULBOCODIUM (L.) SEBAST. & MAURI

(*Crocus bulbocodium* L.)

Famiglia Iridaceae



Nome comune: zafferanetto
comune

Steno-Mediterranea in senso
stretto (con areale limitato alle
coste mediterranee: area
dell'Olivo).

Periodo di fioritura: da gennaio
ad aprile



STERNBERGIA LUTEA (L.) KER GAWL. EX SPRENG.

Famiglia *Amaryllidaceae*



Nome comune: Zafferanastro
giallo

Mediterranea-Montana -
Specie con areale simile a
quello delle Steno-
mediterranee oppure delle
Euri-mediterranee, ma
limitatamente alle zone
montane.

Periodo di fioritura: fine
settembre -ottobre

Non va assolutamente raccolta sia perché estremamente velenosa sia perché è protetta (inserita nell'Allegato II della convenzione di Washington CITES).



ORNITHOGALUM UMBELLATUM L.

Famiglia *Asparagaceae*



Nome comune: latte di gallina

Mediterranea, prati freschi e
boscaglie.

Periodo di fioritura: aprile-
maggio



MUSCARI COMOSUM (L.) Mill.

Famiglia *Asparagaceae*



Nome comune: Lampascione
Euri-Mediterranea, con areale
centrato sulle coste
mediterranee, ma con
prolungamenti verso nord e
verso est.
Periodo di fioritura: febbraio-
aprile





GLADIOLUS ITALICUS MILL.
Famiglia *Iridaceae*

Nome comune: gladiolo dei
campi

Specie eurimediterranea

Periodo di fioritura: marzo-aprile



Settimana
della
Biodiversità
Pugliese
Agricoltura
Alimentazione
e Ambiente

17-21
MAGGIO
2021

CHAMAEIRIS FOETIDISSIMA (L.) MEDIK

Famiglia *Iridaceae*



Nome comune: giaggiolo
fetido

Specie eurimediterranea

Periodo di fioritura: aprile-
luglio



Settimana
della
Biodiversità
Pugliese
Agricoltura
Alimentazione
e Ambiente

17-21
MAGGIO
2021

MORAEA SISYRINCHIUM (L.) KER-GAWL.
(*IRIS SISYRINCHIUM* L.)
FAMIGLIA IRIDACEAE



Nome comune: giaggiolo dei poveretti

Mediterranea in senso stretto (con areale limitato alle coste mediterranee: area dell'Olivo).

Periodo di fioritura: aprile-maggio



ASPHODELINE LUTEA (L.) RCHB.

Famiglia *Asphodelaceae*



Nome comune: asfodelo giallo

Mediterranea orientale

Periodo di fioritura: marzo-aprile



PANCRATIUM MARITIMUM L.
Famiglia *Amaryllidaceae*



Nome comune: giglio di mare,
pancrazio marino

Mediterranea in senso stretto

Periodo di fioritura: giugno-ottobre

Il pancrazio sta diventando via via sempre più raro a causa dello sfruttamento delle coste a scopi balneari che provoca la progressiva scomparsa dei suoi habitat prioritari.



CHARYBDIS MARITIMA (L.) SPETA
(*URGINEA MARITIMA* (L.) BAKER)
Famiglia *Asparagaceae*



Nome comune: scilla

Mediterranea in senso stretto

Periodo di fioritura: agosto-ottobre

A rischio



Settimana
della
Biodiversità
Pugliese
Agricoltura
Alimentazione
e Ambiente

17-21
MAGGIO
2021